

### Gebrauchsanweisung

rhizup sind hochkonzentrierte Endomykorrhizapilze in einer stabilen, flüssigen Lösung für die Pflanzenzucht. Die gewählten Mykorrhizapilze gehen eine sehr enge Symbiose mit Pflanzen ein, helfen den Pflanzen die Nährstoffe besser und in grösseren Mengen aufzunehmen.

Die Pflanzen benötigen nur 1 Applikation pro Zyklus. Bei Bewässerungssystemen beachten, dass die Filter mit Grössen 130 Mikron und kleiner entfernt werden sollten. In den ersten 10-14 Tagen ab der Applikation mit rhizup keine mineralischen Dünger verwenden. Falls nicht möglich, die Dosierung um mind. 40% verringern in den ersten 10-14 Tagen. Kein Phosphor in den ersten 10-14 Tagen! Ab dem 3.-4. Tag nach der Applikation kann mit einem entsprechenden Produkt, ohne Phosphor, das Wurzelwachstum angeregt werden (z.B. growup roots). Geöffnete Flaschen kühl aufbewahren und innert 3 Tagen aufbrauchen.

### Anwendungszeitpunkt und Anzahl Applikationen

Direkt nach erfolgter Pflanzung rhizup ausbringen.  
1 Applikation pro Pflanzzyklus.

### Dosierung:

1ml/lit alle Kulturen

Die tatsächliche Aufwandmenge ist abhängig vom Ernährungszustand der Pflanzen, dem vorhandenen Nährstoffgehalt im Substrat und in der Bodenart.

### Anwendungstechnik:

rhizup durch ausreichendes Schütteln homogenisieren. Beim Befüllen des Fasses folgende Reihenfolge einhalten: 1/3 Wasser einfüllen, mycoup zugeben und gut umrühren, Fass mit Wasser auffüllen, Nährlösung sofort ausbringen.

**Import Schweiz:** up trading GmbH, Mettlenstrasse 24d, CH-9524 Zuzwil, info@uptrading.ch, +41 44 585 31 44



grow-solution.com

**Netto Inhalt: 1000ml (0.98kg) für einmalig 1000L**



### Zusatzangaben zur Gebrauchsanweisung:

Zusatz zu Düngern mit Mikroorganismen

Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.  
Kontakt mit der Haut vermeiden.

### Gehalt:

5 x 10<sup>8</sup> Rhizopagus irregularis  
50'000'000 Koloniebildende Einheiten (KBE) pro Liter

### Mischbarkeit:

Nicht mit Schwefel, Phosphor, Kupfer oder Produkten mit hoher alkalischer Reaktion mischen.  
Keine Produkte auf Basis von Wasserstoffperoxid und Chloriden verwenden, diese mindern die Wirkung von rhizup.

### Lagerungshinweise:

Lagerung nicht unter 5°C und über 30°C, starke Temperaturschwankungen sind zu vermeiden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Trocken und in verschlossenem Gebinde aufbewahren.

### Anwendungshinweise:

Siehe Gebrauchsanweisung. Vor Gebrauch gut schütteln. Bei der Arbeit Handschuhe tragen. Nur bei tatsächlichem Bedarf verwenden. Empfohlene Aufwandmenge insbesondere im Hinblick auf den Bodenschutz nicht überschreiten. Bei einer Mischung mit Pflanzenschutzmitteln grundsätzlich eine Mischprobe vor der Anwendung durchführen.

### Entsorgungshinweise:

Restmengen der bestimmungsgemässen Verwendung zuführen. Leere Packungen können mit dem Hauskehricht entsorgt werden.



Rechtliches Basisland Schweiz 